

## Lathund för smittsamhetsbedömning inom vård och omsorg

### Covid-19

Typ av patient	Smittfrihet
Ingen immunsuppression	Samtliga tre kriterier uppfyllda: <ul style="list-style-type: none"> <li>• feberfrihet i minst 1 dygn <b>och</b></li> <li>• klinisk förbättring <b>och</b></li> <li>• minst 5 dygn efter symtomdebut</li> </ul>
Immunsuppression <i>eller</i> Kritisk sjukdom som vårdats på IVA	<b>Alltid individuell bedömning!</b> Riktmarke för låg smittsamhet, samtliga tre kriterier uppfyllda: <ul style="list-style-type: none"> <li>• feberfrihet i minst 1 dygn <b>och</b></li> <li>• stabil klinisk förbättring <b>och</b></li> <li>• minst 14 dygn efter symtomdebut</li> </ul>
Inga symtom	5 dygn efter provtagningsdatum

### Influensa A och B

Typ av patient	Smittfrihet
Ingen immunsuppression	Samtliga tre kriterier uppfyllda: <ul style="list-style-type: none"> <li>• feberfrihet i minst 1 dygn <b>och</b></li> <li>• klinisk förbättring <b>och</b></li> <li>• minst 5 dygn efter symtomdebut</li> </ul>
Immunsuppression	<b>Alltid individuell bedömning!</b>
Inga symtom	5 dygn efter provtagningsdatum
Antiviral behandling mot influensa	Båda kriterier uppfyllda: <ul style="list-style-type: none"> <li>• behandlingen pågått i minst 3 dygn <b>och</b></li> <li>• stabil klinisk förbättring under minst 1 dygn</li> </ul>

### RS-virus

Typ av patient	Smittfrihet
Vuxen utan immunsuppression	Samtliga tre kriterier uppfyllda: <ul style="list-style-type: none"> <li>• feberfrihet i minst 1 dygn <b>och</b></li> <li>• klinisk förbättring <b>och</b></li> <li>• minst 5 dygn efter symtomdebut</li> </ul>
Immunsuppression	Smittförebyggande åtgärder under hela sjukhusvistelsen
Barn	Smittförebyggande åtgärder under hela sjukhusvistelsen
Inga symtom	5 dygn efter provtagningsdatum

Se även [smittskyddsblad covid-19, läkarinformation](#) och [vårdhygienisk riktlinje influensa](#)